

# Echinacin®

## akut

### MADAUS

MADAUS

#### Liebe Patientin, lieber Patient!

Bitte lesen Sie folgende Gebrauchsinformation aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Arzneimittels beachten sollten. Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihren Arzt, Heilpraktiker oder Apotheker.

#### Gebrauchsinformation

#### Echinacin® akut MADAUS

#### Zusammensetzung

10 g (= 10,4 ml)

#### Echinacin® akut MADAUS enthalten:

#### Arzneilich wirksame Bestandteile:

Aconitum Dil. D 4	1,50 g
Baptisia (HAB 1934) Dil. D 2 (HAB, Vorschrift 3a)	1,50 g
Belladonna Dil. D 4	1,50 g
Bryonia Dil. D 2	1,50 g
Myristica sebifera (HAB 1934) Dil. D 3 [HAB, SV 5a, Lsg. D1 mit Ethanol 62% (m/m)]	1,00 g
Echinacea Ø	3,00 g

Die Bestandteile 1 bis 5 werden über eine Stufe gemeinsam potenziert mit Ethanol 15% (m/m).

Mischung

Inhalt: 50 ml

#### Homöopathisches Arzneimittel bei Entzündungen

#### Pharmazeutischer

#### Unternehmer/Hersteller:

MADAUS GmbH

51101 Köln

Tel.: 0221 / 8998-0

Fax: 0221 / 8998-711

e-mail: info@madaus.de

#### Anwendungsgebiete

Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören: unterstützende Behandlung bei entzündlichen Erkrankungen.

Bei anhaltenden, unklaren oder neu auftretenden Beschwerden sollte ein Arzt aufgesucht werden, da es sich um Erkrankungen handeln kann, die einer ärztlichen Abklärung bedürfen.

#### Gegenanzeigen

Wann dürfen Sie **Echinacin® akut MADAUS** nicht anwenden?

Sie dürfen **Echinacin® akut MADAUS** nicht einnehmen, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie auf Korbblütler oder andere Wirk- oder Hilfsstoffe dieses Arzneimittels (Echinacea) überempfindlich reagiert haben oder wenn eine fortschreitende Systemerkrankung vorliegt wie

- Tuberkulose
- Leukämie bzw. Leukämie-ähnliche Erkrankungen (Leukosen)
- systemisch entzündliche Erkrankungen des Bindegewebes (Kollagenosen)
- Autoimmunerkrankungen
- multiple Sklerose
- AIDS-Erkrankung, HIV-Infektion oder andere chronische Viruserkrankungen

#### Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise

**Echinacin® akut MADAUS** enthält 59 Vol.-% Alkohol.

*Was müssen Sie in der Schwangerschaft und Stillzeit beachten?*

Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen, sollte **Echinacin® akut MADAUS** in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.



# Echinacin®

## akut

### MADAUS

MADAUS

*Was ist bei Kindern zu berücksichtigen?*

Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.

#### Wechselwirkungen

*Was sollten Sie beachten?*

#### Allgemeiner Hinweis:

Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.

#### Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung

Die folgenden Angaben gelten, soweit Ihnen **Echinacin® akut MADAUS** nicht anders verordnet wurde. Bitte halten Sie sich an die Anwendungsvorschriften, da **Echinacin® akut MADAUS** sonst nicht optimal wirken kann.

*Wieviel **Echinacin® akut MADAUS** und wie oft sollten Sie **Echinacin® akut MADAUS** einnehmen?*

Soweit nicht anders verordnet:  
Bei akuten Zuständen alle halbe bis ganze Stunde, höchstens 12mal täglich, je 5 – 10 Tropfen einnehmen.

*Wie lange sollten Sie **Echinacin® akut MADAUS** einnehmen?*

**Echinacin® akut MADAUS** enthält Echinacea und sollte nicht länger als 2 Wochen eingenommen werden.

#### Nebenwirkungen

*Welche Nebenwirkungen können bei der Anwendung von **Echinacin® akut MADAUS** auftreten?*

Sehr selten können Überempfindlichkeitsreaktionen auftreten.

Für Arzneimittel mit Zubereitungen aus Sonnenhut wurden Hautausschlag, Juckreiz, selten Gesichtsschwellung, Atemnot, Schwindel und Blutdruckabfall beobachtet. Das Arzneimittel ist dann abzusetzen und ein Arzt aufzusuchen.

#### Hinweis:

Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.

Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, die nicht in dieser Packungsbeilage aufgeführt sind, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

#### Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels

Das Verfalldatum dieser Packung ist auf der Faltschachtel und dem Etikett der Flasche aufgedruckt.

Verwenden Sie diese Packung nicht mehr nach diesem Datum!

Nicht über 25 °C lagern.

#### Stand der Information

September 2005



M.-Nr. 229 406



Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren!

