

Reparil®-Gel N

MADAUS

Gel

MADAUS

Gebrauchsinformation: Information für den Anwender

Reparil® -Gel N

Wirkstoffe: 1% Aescin und 5% Diethylaminsalicylat

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.

Dieses Arzneimittel ist ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muss Reparil®-Gel N jedoch vorschriftsmäßig angewendet werden.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn sich Ihre Symptome verschlimmern oder keine Besserung eintritt, müssen Sie auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen.
- Wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

Diese Packungsbeilage beinhaltet:

1. Was ist Reparil®-Gel N und wofür wird es angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Anwendung von Reparil®-Gel N beachten?
3. Wie ist Reparil®-Gel N anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Reparil®-Gel N aufzubewahren?
6. Weitere Informationen

1. WAS IST REPARIL®-GEL N UND WOFÜR WIRD ES ANGEWENDET?

Reparil®-Gel N ist ein abschwellendes, entzündungshemmendes und schmerzlinderndes Gel.

Anwendungsgebiete:

Verletzungen mit Prellungen, Verstauchungen, Quetschungen, Blutergüssen, Sehnenscheidenentzündungen.

Schmerzsyndrome der Wirbelsäule (Bandscheibe, Nackenschmerzen, Hexenschuß, Ischias).

Oberflächliche Venenentzündungen, Krampfadern.

Zur Venenpflege nach Injektionen bzw. Infusionen.

2. WAS MÜSSEN SIE VOR DER ANWENDUNG VON REPARIL®-GEL N BEACHTEN?

Reparil®-Gel N darf nicht angewendet werden: Reparil®-Gel N soll nicht auf offene Hautstellen, Schleimhäute und strahlenbehandelte Hautpartien aufgetragen werden.

Besondere Vorsicht bei der Anwendung von Reparil®-Gel N ist nicht erforderlich.

Bei Anwendung von Reparil®-Gel N mit anderen Arzneimitteln.

Keine Wechselwirkungen bekannt.

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel anwenden bzw. vor kurzem eingenommen/angewendet haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

Schwangerschaft und Stillzeit

Eine Langzeitbehandlung auf großen Flächen sollte während der Schwangerschaft und Stillzeit vermieden werden, ebenso die Anwendung im Brustbereich während der Stillzeit.

Fragen Sie vor der Anwendung von allen Arzneimitteln Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen
Es sind keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.

3. WIE IST REPARIL®-GEL N ANZUWENDEN?

Wenden Sie Reparil®-Gel N immer genau nach der Anweisung in dieser Packungsbeilage an. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

Falls vom Arzt nicht anders verordnet, ist die übliche Dosis:

Reparil®-Gel N soll ein- bis mehrmals täglich angewendet werden.

Art der Anwendung:

Reparil®-Gel N soll auf die Haut über dem erkrankten Bereich aufgetragen und verteilt werden. Einmassieren ist nicht erforderlich, wenn erwünscht, jedoch möglich.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Arzneimittels haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?

Wie alle Arzneimittel kann Reparil®-Gel N Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.



Reparil®-Gel N

MADAUS

Gel

Bei der Bewertung von Nebenwirkungen werden folgende Häufigkeitsangaben zugrunde gelegt:

Sehr häufig: mehr als 1 Behandelten von 10
Häufig: 1 bis 10 Behandelte von 100
Gelegentlich: 1 bis 10 Behandelte von 1.000
Selten: 1 bis 10 Behandelte von 10.000
Sehr selten: weniger als 1 Behandelte von 10.000
Nicht bekannt: Häufigkeit auf Grundlage der verfügbaren Daten nicht abschätzbar

Mögliche Nebenwirkungen:

In sehr seltenen Fällen können allergische Hauterscheinungen auftreten.

Informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker, wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Arzneimittels haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

5. WIE IST REPARIL®-GEL N AUFZUBEWAHREN?

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf dem Umkarton/Tube nach „Verwendbar bis“ angegebenen Verfalldatum nicht mehr anwenden.

Aufbewahrungsbedingungen:

Für dieses Arzneimittel sind keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich.

6. WEITERE INFORMATIONEN

Was **Reparil®-Gel N** enthält:

Die Wirkstoffe sind:

100 g **Reparil®-Gel N** enthalten:

Aescin	1 g
Diethylaminsalicylat	5 g

Die sonstigen Bestandteile sind:

Polyacrylsäure, Macrogol-6-Capryl-/Caprinsäure-Glyceride, Edetinsäure-Natrium, Trometamol, 2-Propanol, Geruchsstoffe

Wie **Reparil®-Gel N** aussieht und Inhalt der Packung:

Reparil®-Gel N ist ein transparentes, farbloses bis schwach gelbliches Gel.

Originalpackung mit 40 g [N1] und 100 g [N2] Gel.

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller:

MADAUS GmbH, 51101 Köln
Tel.: 0221/8998-0, Fax: 0221/8998-711
e-mail: info@madaus.de

Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt überarbeitet im Juli 2008.

Eigenschaften

Reparil®-Gel N ist eine Spezialzubereitung in alkoholischer Grundlage mit Dreifachwirkung: abschwellend, entzündungshemmend und schmerzlindernd.

Aescin in hautdurchgängiger Form verhindert Wasseransammlungen im Gewebe und führt zur Abschwellung des Gewebes. Lokale Schwellungen, die Schweregefühl und Spannungsschmerz verursachen, werden rasch beseitigt. Entzündliche Prozesse werden wirksam bekämpft.

Die Salicylsäureverbindung verstärkt den entzündungshemmenden Effekt und hat eine besonders tiefenwirksame, schmerzlindernde Wirkung.

Reparil®-Gel N hat außerdem noch folgende Vorzüge: **Reparil®-Gel N** ist transparent und dringt rasch und vollständig in das erkrankte Gewebe ein.

Reparil®-Gel N fettet nicht, schmiert nicht und ist deshalb besonders angenehm und sauber anwendbar.

Reparil®-Gel N kühlt den schmerzenden Bereich, ist hautschonend und auch für empfindliche Hautpartien hervorragend verträglich.